

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.

C. C. P. CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

BULLETIN n° 21 de JUIN 1962

13 Juin 1962

V I G N E

AVERTISSEMENTS

MILDIOU. - En raison du développement de la végétation, effectuer un traitement à la réception du présent avis.

VERS de la GRAPPE (Cochylis et Eudemis). - Après un vol faible, quelques pontes sont visibles dans les secteurs habituellement parasités; dans ces derniers et en vue de limiter l'importance de la 2ème génération, il est recommandé d'exécuter un traitement; celui-ci peut être fait :

- à la réception de l'avis à l'aide d'un des produits "préventifs" suivants :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - Arséniate de plomb | - D.D.D. |
| - D.D.T. | - sévin |
| - Roténone : en poudrage seulement | |

- ou au cours de la semaine du 18 au 23 juin à l'aide d'un des produits "curatifs" suivants :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Parathion éthyle | - trichlorfon |
| - parathion méthyle | - E.P.N. |
| - diazinon | - mevinphos (phosdrine) |
| - malathion | - azinphos (gusathion) |
| - chlorthion : en poudrage seulement | |

Il est à signaler que dans le vignoble de la région d'Epernay, un vol assez important et des pontes nombreuses ont été observés.

INFORMATION

OIDIUM. - Ajouter un produit mouillable à la bouillie antimildiou ou exécuter un poudrage après la pulvérisation.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

TAVELURE. - Renouveler la couverture, surtout dans les secteurs où des orages se sont produits.

P1.42

INFORMATIONS

OIDIUM du POMMIER.- Poursuivre la protection des arbres selon les indications de nos précédents avis.

ANTHRACNOSE du CERISIER.- Les taches provoquées par ce champignon commencent à apparaître. Effectuer un traitement avec un produit à base de zinèbe, de zirame, de thirame ou de captane.

MONILIA.- Des attaques ont été signalées localement, le traitement indiqué pour lutter contre l'antracnose peut limiter l'extension des dégâts.

PUCERONS.- Surveiller attentivement les vergers et intervenir dès l'apparition des colonies.

GRANDE CULTURE

INFORMATIONS

Colza de Printemps

Alors que certains colzas vont entrer en pleine floraison, d'autres n'ont pas encore leur hampe florale dégagée.

Meligèthes.- Surveiller attentivement les cultures non en fleurs. Intervenir éventuellement avant tout dégât sérieux, les attaques sont toujours plus dommageables sur colza de printemps que sur colza d'hiver.

Charançon des siliques.- Les concentrations de cet insecte s'observent actuellement sur colza de printemps, elles ne seront terminées qu'après la défloraison totale des colzas d'hiver. Surveiller les cultures et intervenir éventuellement.

Si un traitement se justifie (en moyenne plus d'un insecte pour deux plantes), le réaliser dès la pleine floraison, les pontes sur jeunes siliques étant particulièrement rapides.

Seuls les produits reconnus non dangereux pour les abeilles seront mis en oeuvre.

Betterave industrielle

Pégomyie.- Le premier vol de mouche est presque terminé, les pontes se raréfient.

Seules les cultures se trouvant dans de très mauvaises conditions de végétation peuvent encore requérir une protection (betteraves petites, bien que levées depuis plusieurs semaines, et déjà très contaminées antérieurement).

A noter que les dernières betteraves semées sont pratiquement indemnes du parasite.

Pomme de terre

Mildiou :

Il n'y a pas à envisager de traitement dans un proche avenir.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire de REIMS

Imprimerie de la Station de Champagne - Directeur-gérant : L. BOUYX